



# Odvýkací stav u závislosti na alkoholu a jeho léčba

Alkoholový **odvýkací stav** neboli syndrom z vysazení (abstinenční syndrom) se vyskytuje především u osob s dlouhodobým a intenzivním abúzem alkoholu. Může mít podobu od nekomplikovaných odvykacích příznaků až po život ohrožující stav – delirium tremens. Rozvíjí se během *6–48 hodin* po přerušení nebo podstatném snížení příjmu alkoholu.


## Příznaky nekomplikovaného alkoholového odvykacího stavu

- Třes (nejčastěji rukou), zvýšené pocení, tachykardie, zvýšení tlaku krve, úzkost, vnitřní neklid, podrážděnost, malátnost či slabost, parestzie končetin, nauzea, zvracení, poruchy spánku, děsivé sny, prchavé halucinace.
- Odeznívá během 3–5 dnů.

## Terapie alkoholového odvykacího stavu

- režimová opatření – klidový režim, odstranění nadbytečných podnětů, klidná polotmavá místnost, monitorování tlaku krve a pulzu,
- benzodiazepiny, tiaprid , clomethiazol  v kapslích u těžších průběhů (jen během hospitalizace), thiamin, hořčík,
- dostatečná hydratace a zajištění elektrolytové rovnováhy.

## Komplikace alkoholového odvykacího stavu

- *Epileptické záchvaty* – lékem volby jsou benzodiazepiny, především diazepam ; dále pak  $\text{MgSO}_4$  10% či 20% v intravenózním či intramuskulárním podání.
- Progrese do deliria.

## Delirium tremens

Jedná se o nejtěžší formu abstinenčního syndromu. Rozvíjí se u 5–6 % závislých na alkoholu, typicky 2.–3. den abstinence. Někdy začíná už při odeznívající ebrietě, vzácně i během pijáckého excessu (intoxikační delirium). Úmrtnost se dříve udávala 5–10 %, dle novějších studií nepřesahuje 1 %.

## Soubor příznaků delirantního stavu

1. **Psychické:** velký psychomotorický neklid s agitovaností, poruchy vědomí se zmateností, časová a místní desorientace, zrakové či taktilní halucinace, poruchy spánku (často inverze), inkoherentní myšlení, emoční nepřiléhavost, strach, úzkost.
2. **Somatické a vegetativní:** tachykardie, zvýšení krevního tlaku, horečka, zrychlené dýchání, poruchy vnitřního prostředí (dehydratace, elektrolytová dysbalance), dilatované zornice, překrvené spojivky, inkontinence.
3. **Neurologické:** třes (prstů, někdy dokonce celých končetin, hlavy), ataxie, hyperkineze, hyperreflexie, epileptické paroxysmy.

## Terapie delirantního stavu

*Tišení akutního neklidu:* clomethiazol (Heminevrin), v dávkách do 4,8 g/den, je kontraindikován při bronchopulmonálním postižení, v tom případě jsou doporučována antipsychotika (risperidon, tiaprid), dále pak benzodiazepiny.

*Úprava a udržování homeostázy vnitřního prostředí:* doplňovat tekutiny a minerály, podávat  $\text{MgSO}_4$ , vitaminy skupiny B, glukózu.

*Prevence a léčba somatických komplikací:* nejčastěji poruchy jaterních funkcí, pneumonie, krvácení do GIT, aj.

## Odkazy

### Související články

- Duševní poruchy vyvolané požíváním alkoholu
- Léčba závislosti na alkoholu

### Použitá literatura

- RABOCH, Jiří, a Pavel, PAVLOVSKÝ. *Psychiatrie*. 1.. vydání. Karolinum Press, 2013. 468 s. ISBN 9788024619859.

### Převzato z

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. [cit. 2010]. <<http://jirben.wz.cz>>.