


Parafimóza

Parafimóza je akutní bolestivý stav v urologii, při kterém je předkožka delší dobu přetažena do *sulcus coronarius* za glans penis (nejčastěji z iatrogenní příčiny např. při katetrizaci močového měchýře či vyšetření penisu), což vede k zaškrcení *glans*. Dochází ke zhoršení venózního a lymfatického odtoku, postupně se rozvíjí **otok** *glans penis*. S narůstajícím edémem je zhoršen i přítok arteriální krve. Kvůli zvětšujícímu se otoku nejde předkožka přetáhnout zpět. Tento stav může vést až k ischemii.

Phimosis je na rozdíl od tohoto stavu neurgentní situace, při níž předkožka nejde přetáhnout za glans penis.



Paraphimosis

Terapie

Řešením je v prvních hodinách manuální repozice parafimózy. Tlakem na předkožku se zmenší otok *glans penis*, poté je možné pokusit se **předkožku manuálně reponovat**. Pokud se to nepodaří, je nutná **incize**. Protože se jedná o velice bolestivý stav, je nutné pacientovi podat dostatečnou dávku analgetik.

Odkazy

Související články

- Penis
- Balanitis
- Phimosis
- M. Peyronie

Externí odkazy

- BROOKS, Nathan A, et al. *Paraphimosis* [online]. Medscape, Poslední revize 2015-01-09, [cit. 2017-06-17]. <<https://emedicine.medscape.com/article/442883-overview>>.

Použitá literatura

- ŠTORK, Jiří, et al. *Dermatovenerologie*. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.